



"Héritage médical"

Perandren

NOM DÉPOSÉ

Androgène par excellence pour l'administration parentérale.

INDICATIONS

Le propionate de testostérone Ciba s'emploie dans le traitement de l'insuffisance hormonale testiculaire, à titre de substitut de la sécrétion des cellules de Leydig. L'expression "hypoleydigisme" désigne cet état qui comprend les affections suivantes: eunuchoïdisme, castration, panhypopituitarisme, syndrome de Fröhlich, insuffisance surrénalienne, âge critique, gynécomastie, etc. La testostérone, à cause de l'importance de son rôle dans le métabolisme des protéines, est appelée à occuper la première place dans la thérapeutique des maladies caractérisées par une déperdition protéinique, nonobstant le sexe des patients. A l'heure actuelle, on s'en est servi avec succès dans la maladie de Simmond, le syndrome de Sheehan, le nanisme hypophysaire, le syndrome de Cushing, l'ostéoporose, les retards de croissance, la thyrotoxicose, et pour compenser des états de dénutrition et de débilité. Comme elle exerce un effet inhibiteur sur les tropines hypophysaires, on a mis à profit cet antagonisme pour enrayer la production du lait, arrêter certaines hémorragies utérines, soulager certains cas de dysménorrhée et calmer les douleurs post-partum. Quoiqu'on ignore encore le mécanisme précis de son action sur le syndrome angineux qu'on présume, cependant, être d'ordre vaso-moteur, les succès obtenus à date dans la prophylaxie de ces troubles justifient amplement l'emploi du médicament.

POSOLOGIE

Elle varie suivant la nature des maladies et leur gravité. Les doses d'attaque moyennes sont de 25 mgms, 2 à 3 fois par semaine. Les doses d'entretien sont en général de 10 mgms, 1 à 3 fois par semaine. Chez la femme on déconseille l'administration d'une dose totale excédant 300 mgms par mois. Chez l'homme des quantités dépassant largement cette dose ont été administrées sans conséquences regrettables.

"Héritage médical"

Septième étape

Aux yeux avides du jeune homme, la sagesse du vieillard ouvre des horizons sans cesse nouveaux: le Livre, le Crâne, le Globe et l'Eprouvette, symboles du Savoir; l'éternel combat contre la Mort; l'Univers pour champ d'action; et, dans l'Eprouvette, l'avenir de la Médecine.

Perandren

NOM DÉPOSÉ



Le Perandren est le propionate de testostérone Ciba. Son action principale est masculinisante, c'est-à-dire qu'elle s'exerce sur des cellules physiologiquement préparées pour l'utilisation de la sécrétion hormonale du sexe masculin; comme cette action dépend largement de l'assimilation des protéines, les cellules des autres systèmes en profiteront également d'une façon plus générale, moins orientée mais éminemment désirable. Cet aspect de la pharmacologie de la testostérone est peut-être le plus intéressant de tous, à cause des vastes horizons qu'il ouvre à la thérapeutique. Jusqu'à ces dernières années on employait les hormones sans saisir leur point d'accrochage sur l'organisme. Grâce à l'accroissement de nos connaissances sur les relations du métabolisme et des hormones, nous sommes maintenant en mesure de diriger notre thérapeutique d'une façon moins empirique et d'élargir chaque jour davantage le champ de l'endocrinothérapie.





Perandren

NOM DÉPOSÉ

PRÉSENTATION

Ampoules de 1 c.c. à 5, 10 et 25 mgms, boîtes de 3, 6 et 50.

Onguent (1 Gm. = 2 mgms de testostérone), tubes de 25 et 50 Gm.

